

## Problemas – Tema 4

### Solución a problemas de Repaso y Ampliación de la primera evaluación - Hoja 3 - Problemas 2, 3, 6

#### Hoja 3. Problema 2

Resuelto por Fermín Roldán (enero 2015)

#### 2. Comprobar:

$$\frac{\operatorname{sen} 2x}{1 + \cos 2x} = \operatorname{tg} x$$

$$\frac{2\operatorname{sen}x \cdot \operatorname{cos}x}{1 + \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x} = \operatorname{tg}x$$

Sustituimos  $1 - \operatorname{sen}^2 x$  por  $\cos^2 x$

$$\frac{2 \operatorname{sen}x \cdot \operatorname{cos}x}{\cos^2 x + \cos^2 x} = \operatorname{tg}x$$

$$\frac{2 \operatorname{sen}x * \operatorname{cos}x}{2 \cos^2 x} = \operatorname{tg}x$$

$$\frac{\operatorname{sen}x}{\operatorname{cos}x} = \operatorname{tg}x$$

Sustituimos  $\frac{\operatorname{sen}x}{\operatorname{cos}x}$  por  $\operatorname{tg}x$

$$\operatorname{tg}x = \operatorname{tg}x$$

## Hoja 3. Problema 3

### Resuelto por Alejandro Muñoz de la Rosa (febrero 2015)

#### 3. Comprobar:

$$\frac{\operatorname{sen}(2 \cdot a)}{1 - \cos^2 a} \cdot \frac{\operatorname{sen}(2 \cdot a)}{\cos a} = 4 \cos a$$

Partimos de la expresión del ángulo doble

$$\operatorname{sen}(2a) = 2 \operatorname{sen}(a) \cos(a)$$

Sustituimos en la igualdad de partida.

$$\frac{4 \operatorname{sen}^2 a \cdot \cos^2 a}{(1 - \cos^2 a) \cos a} = 4 \cos a$$

De la relación fundamental de trigonometría:  $1 - \cos^2 a = \operatorname{sen}^2 a$

$$\frac{4 \operatorname{sen}^2 a \cdot \cos^2 a}{(\operatorname{sen}^2 a) \cos a} = 4 \cos a$$

Simplificamos:

$$4 \cos a = 4 \cos a$$

## Hoja 3. Problema 6

### Resuelto por Inés Delgado Galindo (enero 2015)

#### 6. Resuelve:

$$\cos^2 x - 3\operatorname{sen}^2 x = 0$$

Dividimos entre  $\cos^2 x$

$$1 - \frac{3\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = 0$$

$$1 - 3\operatorname{tg}^2 x = 0$$

$$\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{3}$$

$$\operatorname{tg} x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pm\sqrt{3}}{3}$$

Los ángulos que tienen esa tangente positiva son:  $30^\circ$  (primer cuadrante) y  $210^\circ$  (tercer cuadrante)

Y los ángulos que tiene esa tangente negativa son:  $150^\circ$  (segundo cuadrante) y  $330^\circ$  (cuarto cuadrante).

Y todos los que sumen  $360^\circ$  grados a los anteriores.

**Por tanto las soluciones son:**

$$30^\circ + 360^\circ \cdot k, 150^\circ + 360^\circ \cdot k, 210^\circ + 360^\circ \cdot k, 330^\circ + 360^\circ \cdot k$$