

Teoría – Tema 4

Notación matricial en la resolución de sistemas de ecuaciones por Gauss

Índice de contenido

Matriz del sistema y matriz ampliada.....	2
Método de Gauss.....	3
Solución única, ausencia de solución e infinitas soluciones en un sistema de ecuaciones.....	5

Matriz del sistema y matriz ampliada

Un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas cada una, forma un sistema de ecuaciones lineales $m \times n$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = c_3 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

El término a_{ij} es el coeficiente de la ecuación i que acompaña a la incógnita x_j . El número i de la ecuación se denomina **fila**, y el valor j de la incógnita x_j se denomina **columna**.

Para representar el **sistema en forma matricial** tomamos únicamente los coeficientes a_{ij} y los ordenamos en filas y columnas:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Forma matricial del sistema}$$

Si incluimos en la representación matricial del sistema la columna de términos independientes c_i tendremos su **matriz ampliada**:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & c_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & c_m \end{pmatrix} \rightarrow \text{Matriz ampliada del sistema}$$

■ Método de Gauss

El método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales $m \times n$ consiste en aplicar repetidamente el método de reducción, hasta obtener un sistema escalonado o triangular equivalente.

Un **sistema triangular** es aquel que tiene nulos todos los coeficientes a_{ij} que se encuentran por debajo o por encima de la **diagonal principal** de la matriz del sistema. La diagonal principal está formada por los coeficientes a_{ii} , $i=1,2,\dots,m$ (es decir, el número de la fila coincide con el número de la columna).

Por norma general, trabajaremos con sistemas 3×3 a lo largo de este curso de 1ºBachillerato.

¿Cómo podemos obtener el sistema triangular equivalente? Aplicando las **operaciones de transformación lineales**: permutar filas, permutar columnas, multiplicar una fila/columna por un número real no nulo, y sumar a una fila/columna el valor de otras filas/columnas multiplicadas por números reales no nulos.

Ejemplo

Resolver
$$\begin{cases} x-2y+4z=1 \\ 4x+y-z=-3 \\ 3x+y+2z=4 \end{cases}$$

Matriz ampliada del sistema $\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$

A la segunda fila le restamos cuatro veces la primera $\rightarrow F'_2 = F_2 - 4F_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 9 & -17 & -7 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

A la tercera fila le restamos tres veces la primera fila $\rightarrow F'_3 = F_3 - 3F_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 9 & -17 & -7 \\ 0 & 7 & -10 & 1 \end{array} \right)$$

La nueva tercera fila será el resultado de multiplicar por nueve la tercera fila y restarle la segunda multiplicada por siete $\rightarrow F'_3 = 9 \cdot F_3 - 7 \cdot F_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 9 & -17 & -7 \\ 0 & 0 & 29 & 58 \end{array} \right)$$

De la tercera ecuación podemos despejar la solución particular para z .

$$29z = 58 \rightarrow z = 2$$

Sustituimos en la segunda ecuación para obtener y .

$$9y - 17 \cdot (2) = -7 \rightarrow y = 3$$

Y de la primera obtenemos x .

$$x - 2 \cdot (3) + 4 \cdot (2) = 1 \rightarrow x = -1$$

Hemos obtenido una solución particular para cada una de las incógnitas. Nuestra solución general es la tupla $(x, y, z) = (-1, 3, 2)$.

Esta tupla solución es la única permitida para el sistema, por lo que estamos ante un sistema compatible determinado.

Solución única, ausencia de solución e infinitas soluciones en un sistema de ecuaciones

Si el sistema posee solución, hablamos de **sistema compatible**. Si no posee solución, es un **sistema incompatible**.

Si existe solución y es única, tendremos **sistema compatible determinado (S.C.D.)**. Si existen infinitas soluciones posibles, según el valor de un parámetro, hablaremos de **sistema compatible indeterminado (S.C.I.)**.

¿Cómo detectar, por el método de Gauss, que el sistema es incompatible (sin solución)? Si al obtener la matriz triangular equivalente a la matriz ampliada de partida, obtenemos una fila i con todos los términos nulos salvo el término independiente $c_i \neq 0$, tendremos un **absurdo matemático o incongruencia**.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_1 \\ 0 & a_{22} & a_{33} & c_2 \\ 0 & 0 & 0 & c_3 \end{array} \right) \rightarrow \text{Si } c_3 \neq 0 \text{ en la tercera ecuación} \rightarrow 0+0+0=c_3 \rightarrow \text{Absurdo}$$

Por lo tanto, si con nuestras operaciones de transformación obtenemos un sistema triangular equivalente donde **aparece un absurdo matemático**, diremos que el **sistema no tiene solución** → **sistema incompatible**.

Ejemplo

Resolver
$$\begin{cases} x+y+z=4 \\ -x+2y-z=0 \\ 2x-y+2z=0 \end{cases}$$

Matriz ampliada del sistema $3 \times 3 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$

Que podemos transformar por Gauss en el sistema triangular equivalente siguiente:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right)$$

En la tercera ecuación llegamos a la incongruencia $0=-4 \rightarrow$ no hay solución → sistema incompatible.

Si no obtenemos ningún absurdo matemático, el sistema siempre tendrá solución: será **compatible**.

Si, por ejemplo, en la fila i obtenemos una igualdad $0=0$, tendremos una ecuación que no aporta información nueva para obtener la solución del sistema. Y como no aporta información nueva, podremos desecharla en nuestras operaciones. Por cada fila que desechemos al llegar a una igualdad $0=0$ diremos que una incógnita se convierte en **parámetro libre** y nuestro sistema tendrá infinitas soluciones dependientes de ese parámetro libre (sistema compatible indeterminado).

Ejemplo

$$\text{Resolver } \begin{cases} 3x - 4y = 2 \\ 12x - 16y = 8 \end{cases}$$

$$\text{Matriz ampliada del sistema } 2 \times 2 \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & 2 \\ 12 & -16 & 8 \end{array} \right)$$

Que podemos transformar por Gauss en el sistema triangular equivalente siguiente:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

En la segunda ecuación llegamos a la igualdad $0=0 \rightarrow$ la segunda ecuación es combinación lineal de la primera \rightarrow infinitas soluciones \rightarrow sistema compatible indeterminado. Cuando tenemos infinitas soluciones es común tomar una de las incógnitas como parámetro. Por ejemplo, si $y=\lambda \rightarrow$ podemos expresar la incógnita x en función del parámetro $\rightarrow 3x=2+4 \cdot \lambda \rightarrow x=\frac{2+4 \cdot \lambda}{3}$

En caso de tener llegar a una solución única para cada incógnita, estaremos ante un sistema compatible determinado (que son lo que hemos realizado, casi mayoritariamente, en Secundaria y en los primeros temas de 1ºBachillerato).