

Teoría – Tema 7

Puntos y rectas simétricos

Índice de contenido

Simetría axial.....	2
Simetría central.....	3

Simetría axial

Dada una recta fija r , los puntos A y A' son simétricos respecto al eje de simetría axial r cuando el segmento $\overline{AA'}$ es perpendicular a r y además el punto de corte de este segmento con el eje es su punto medio M .

Ejemplo

Calcula el punto simétrico de $A(3,2)$ respecto de la recta $r: 2x - y + 1 = 0$.

En primer lugar obtenemos la recta s perpendicular a r que pase por el punto A.

La pendiente $m_r = 2 \rightarrow m_s = -\frac{1}{2} \rightarrow$ Hacemos uso de la ecuación punto pendiente:

$$s: \frac{-1}{2} = \frac{y-2}{x-3} \rightarrow s: x + 2y - 7 = 0$$

Obtenemos el punto de corte de r y s :

$$\begin{cases} r: 2x - y + 1 = 0 \\ s: x + 2y - 7 = 0 \end{cases} \rightarrow M(1,3) \rightarrow \text{Punto medio del segmento } \overline{AA'}$$

Es decir, tenemos el segmento $\overline{AA'}$ de extremos $A(3,2)$, $A'(x,y)$ y punto medio $M(1,3)$. Por lo tanto se cumple la relación:

$$(1,3) = \left(\frac{x+3}{2}, \frac{y+2}{2} \right)$$

Formándose el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1 = \frac{x+3}{2} \\ 3 = \frac{y+2}{2} \end{cases} \rightarrow A'(x,y) = (-1,4)$$

Simetría central

Dada un punto fijo M , los puntos A y A' son simétricos en la simetría central de centro M cuando el punto M es el punto medio del segmento de extremos A y A' . Es decir, la distancia entre los puntos M y A es igual a la distancia entre los puntos M y A' .

Ejemplo

Calcula la recta simétrica de $r: 2x - y = 0$ respecto de la simetría central de centro $M(1, -2)$.

Tomamos dos puntos P y Q cualesquiera de la recta r , y calculamos los simétricos P' y Q' respecto de $M(1, -2)$. Teniendo en cuenta que M será el punto medio de los segmentos $\overline{PP'}$ y $\overline{QQ'}$.

La recta que pase por P' y Q' es la recta simétrica buscada.

Por ejemplo, tomamos $P(0, 0)$ y $Q(1, 2)$.

En el segmento $\overline{PP'}$ de extremos $P(0, 0)$, $P'(x, y)$ y punto medio $M(1, -2)$, se cumple la relación:

$$(1, -2) = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}\right) \rightarrow P'(x, y) = (2, -4)$$

En el segmento $\overline{QQ'}$ de extremos $Q(1, 2)$, $Q'(x, y)$ y punto medio $M(1, -2)$, se cumple la relación:

$$(1, -2) = \left(\frac{x+1}{2}, \frac{y+2}{2}\right) \rightarrow Q'(x, y) = (1, -6)$$

Teniendo dos puntos P' y Q' podemos calcular la recta que pasa por ellos, que será simétrica a r respecto a la simetría central de centro $M(1, -2)$.

$$r': \frac{-6+4}{1-2} = \frac{y+6}{x-1} \rightarrow r': 2x - y - 8 = 0$$