

Problemas – Tema 3

Solución a problemas de Derivabilidad - Hoja 09 - Problemas 2, 5

Hoja 9. Problema 2

2. Demuestra que la ecuación $x^2 = x \cdot \text{sen}(x) + \cos(x)$ tiene solo dos raíces reales.

Sea la función $f(x) = x^2 - x \cdot \text{sen}(x) - \cos(x)$. Es continua y derivable en toda la recta real por ser polinómica y producto con funciones senos y coseno.

Si la función tuviera tres raíces reales, que llamaremos c_1, c_2, c_3 , se cumplirá que $f(c_1) = f(c_2) = f(c_3) = 0$, y podremos aplicar el Teorema de Rolle. En consecuencia, existirán dos valores que anulen la primera derivada.

$$f'(x) = 2x - (\text{sen}(x) + x \cos(x)) + \text{sen}(x) = 2x - x \cos(x) = x(2 - \cos(x))$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow x(2 - \cos(x)) = 0 \rightarrow x = 0, \cos(x) = 2$$

La segunda igualdad $\cos(x) = 2$ no tiene solución, ya que la función coseno está acotada en el intervalo $[-1, 1]$. Por lo tanto, la derivada solo se anula en un único punto $x = 0$.

Y llegamos a un absurdo, ya que deberían existir dos soluciones. Por lo tanto, no existen tres raíces reales. Ahora vamos a demostrar que solo hay dos raíces.

El punto crítico $x = 0$ es un mínimo relativo, ya que la segunda derivada evaluada en $x = 0$ es positiva.

$$f''(x) = 2 - (\cos(x) - x \text{sen}(x)) \rightarrow f''(0) = 1 > 0 \rightarrow x = 0 \text{ es mínimo}$$

Si evaluamos el mínimo en la función $\rightarrow f(0) = -1 \rightarrow$ mínimo en $(0, -1)$

Si evaluamos en $x = -10 \rightarrow f(-10) > 0 \rightarrow f(-10) \cdot f(0) < 0 \rightarrow$ Por Bolzano existe una solución en el intervalo $(-10, 0)$.

Si evaluamos en $x = 10 \rightarrow f(10) > 0 \rightarrow f(0) \cdot f(10) < 0 \rightarrow$ Por Bolzano existe una solución en el intervalo $(0, 10)$.

Conclusión: existen dos soluciones.

Hoja 9. Problema 5

5. Demuestra que la ecuación $x^3 - 27x + m = 0$ no puede tener más de una raíz en el intervalo $(-1, 1)$, cualquiera que sea el valor de m .

Hipótesis de partida: $f(x) = x^3 - 27x + m$ posee dos soluciones en el intervalo $(-1, 1)$.

Si llamamos a estas soluciones $c_1, c_2 \in (-1, 1)$, se cumple:

$$f(c_1) = 0, f(c_2) = 0 \rightarrow f(c_1) = f(c_2)$$

La función es continua y derivable en toda la recta real por ser polinómica. Por lo que podemos aplicar el Teorema de Rolle en el intervalo (c_1, c_2) . Recuerda que $c_1, c_2 \in (-1, 1)$. Por lo tanto:

$$\exists \varphi \in (-1, 1) / f'(\varphi) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2 - 27, f'(\varphi) = 0 \rightarrow 3\varphi^2 - 27 = 0 \rightarrow \varphi = \pm 3$$

Y llegamos a un absurdo, ya que si $\varphi = \pm 3$ no se cumple $\varphi \in (-1, 1)$. En consecuencia la hipótesis no es cierta. No puede haber más de una raíz en el intervalo.