

Problemas – Tema 4

Solución a problemas de Repaso y Ampliación 1ª Evaluación - Hoja 07 - Problemas 2

Hoja 7. Problema 2

Resuelto por Alberto Jiménez Molina (enero 2015)

2. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones continuas en $[0,1]$, tales que $f(0) > g(0)$ y $f(1) < g(1)$. Demostrar que sus gráficas se cortan.

Proponemos dos formas de demostrarlo.

Demostración 1

Empecemos suponiendo que en el intervalo $[0,1]$ no hay una solución.

Primero dividamos el intervalo por la mitad en el punto medio $x=1/2$ donde veremos su imagen en $f(x)$ y $g(x)$.

Si $g(1/2)=f(1/2)$ ya hemos acabado de demostrar que existe un punto donde se cortan, por lo que la hipótesis de partida sería falsa.

Si $g(1/2)$ no es igual a $f(1/2)$ podemos tomar otro intervalo donde se cambia la relación de las funciones de mayor a menor ya sea $[0, 1/2]$ o $[1/2, 1]$.

A partir de esto podemos repetir este proceso de forma sucesiva (Postulado de Cantor) hasta que converja en un punto $\alpha \in (0,1)$. Si este valor $\alpha \in (0,1)$ cumple $f(\alpha) > g(\alpha)$ ó $f(\alpha) < g(\alpha)$, como la función es continua en todo el intervalo y en consecuencia continua en α , existirá un entorno alrededor de α donde los puntos son todos $f(\alpha+\delta) > g(\alpha+\delta)$ ó todos $f(\alpha+\delta) < g(\alpha+\delta)$.

Ahí llegamos a una contradicción, puesto que α lo hemos obtenido como intersección de sucesivos intervalos donde la función cambia de $f(x) > g(x)$ a $f(x) < g(x)$ en los extremos de los intervalos. Y por otro lado, por continuidad, existe un entorno alrededor de α donde todos los puntos de ese entorno cumplen que $f(x) > g(x)$ ó $f(x) < g(x)$, peor sin cambiar de signo al evaluar en los extremos del intervalo.

Por lo tanto la hipótesis de partida es falsa y $f(x)$ y $g(x)$ tiene una solución en el intervalo

abierto $(0,1)$: $\exists c \in (0,1) / f(c) = g(c)$

Demostración 1

Creamos la función auxiliar $h(x) = f(x) - g(x)$. Esta función es continua en $[0,1]$ por ser diferencia de dos funciones que sabemos que son continuas en ese intervalo. Además, según las condiciones del enunciado:

$$h(0) = f(0) - g(0) > 0$$

$$h(1) = f(1) - g(1) < 0$$

Por lo que estamos en condiciones de aplicar el Teorema de Bolzano:

$$\exists c \in (0,1) / h(c) = 0 \rightarrow \exists c \in (0,1) / f(c) - g(c) = 0 \rightarrow \exists c \in (0,1) / f(c) = g(c)$$